TRAITEMENT ORAL DE LA TRYPANOSOMIASE HUMAINE AFRICAINE: FAISABILITÉ DANS LES COMMUNAUTES DU LITTORAL GUINEEN

37th InternationalScientific Council for Trypanosomiasis Research and Control (ISCTRC) Conference in Nairobi, Kenya 15th – 19th September, 2025

CSIRLT-Cameroun

STRATÉGIE ACTUELLE EN GUINÉE

Recherche active et précoce de cas, Diagnostic passif dans les structures de Santé









Lutte anti vectorielle



Traitement

JUSTIFICATION

THA, mortelle sans traitement, traitement classique très contraignant pour le malade et le personnel soignant, ponction lombaire, des jours d'hospitalisation et perfusions intraveineuses.

Le traitement efficace 2ème stade, médicaments capables de franchir la barrière hémato-encéphalique.

Développement traitement efficace très difficile, rareté des fonds et manque d'intérêt des géants pharmaceutiques.



Aucune étude n'a encore été menée en Guinée pour connaitre la perception de la communauté sur la THA et son traitement

Traitement oral développé par **DNDI**:
(fexinidazole) et (Acoziborole).

- Efficacité égale
- Pas de contrainte




ACOZIBOROLE




DÉMARCHE STRATÉGIQUE

❑ Objectifs

Déterminer les facteurs influençant la faisabilité de l'introduction du nouveau traitement de la THA et son utilisation dans les trois foyers endémiques de la Guinée.



Site d'étude




❑ Méthodologie

- Questionnaires

RESULTATS 1/5

Caractéristiques sociodémographiques des repondants, en fonction des districts




Association significative

Connaissance:

- District
- Sexe
- Avoir été à l'école

RESULTATS 2/5

Score de connaissance sur le mode de transmission




6 Questions/Score

- ✓ 0-2:Médiocre
- ✓ 3-4:Moyenne
- ✓ >4:Avancée

RESULTATS 3/5

Connaissance des repondants sur le nouveau traitement




Pp canaux

- Personnel santé
- Réco
- Mosquée


RESULTATS 4/5


Attitude des repondants face au traitement oral




RESULTATS 5/5

Pratique des repondants





Traitement oral



PEC

Facile

Logistique lourde





Douleur PL

Longue durée hospitalisation



CONCLUSION

- La mise en route du traitement oral de la THA dans les 3 foyers endémiques de Guinée devrait être accompagnée et même précédée par des campagnes d'information à travers les principales sources d'information : les mosquées, le personnel de santé et les RECO,
- Avec ce nouveau traitement, les barrières géographiques, financières et même la technique des ponctions lombaires douloureuses qui pouvaient justifier la non adhésion des malades trypanosomés au traitement seront grandement minimisées,
- Le nouveau médicament pourrait être largement adopté, facilitant ainsi la prise en charge et le contrôle de la THA dans les foyers endémiques.

Merci

